

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Beatrice PERRON, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: COSMETIC COMPOSITION CONTAINING MINERAL PARTICLES AND A
POLYETHYLENEIMINE

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☒ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):
Application No. Date Filed
60/432,623 December 12, 2002
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
France	0215175	December 2, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
☐ are submitted herewith
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Richard L. Treanor

Registration No. 36,379

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **05 SEP. 2003**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



THIS PAGE BLANK (USPTO)



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE 2 DEC 2002 LIEU 75 INPI PARIS B N° D'ENREGISTREMENT 0215175 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 02 DEC. 2002		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE L'OREAL Françoise LE BLAINVAUX - D.I.P.I 6, rue Bertrand Sincholle 92585 CLICHY cedex France	
Vos références pour ce dossier (facultatif) OA02394/FLB			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale N° _____ Date ____/____/____ ou demande de certificat d'utilité initiale N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale N° _____ Date ____/____/____			
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition cosmétique comprenant des particules minérales et une polyéthylèneimine			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		L'ORÉAL	
Prénoms			
Forme juridique		SA	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Adresse	Rue	14, rue Royale	
	Code postal et ville	75008	PARIS
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		01.47.56.71.42	
N° de télécopie (facultatif)		01.47.56.73.88	
Adresse électronique (facultatif)			

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2



Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **2 DEC 2002**LIEU **75 INPI PARIS B**

N° D'ENREGISTREMENT

0215175

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 260899

Vos références pour ce dossier : (facultatif)		OA02394/FLB	
6 MANDATAIRE			
Nom		LE BLAINVAUX	
Prénom		Françoise	
Cabinet ou Société		L'ORÉAL	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	6 rue Bertrand Sincholle	
	Code postal et ville	92585	CLICHY Cedex
N° de téléphone (facultatif)		01.47.56.71.42	
N° de télécopie (facultatif)		01.47.56.73.88	
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Françoise LE BLAINVAUX 02 Décembre 2002		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT DES PARTICULES MINERALES ET UNE POLYETHYLENEIMINE

5

La présente invention est relative à une composition cosmétique, notamment capillaire, contenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, des particules minérales et au moins une polyalkylèneimine. Elle vise également un procédé de traitement cosmétique des cheveux comprenant l'application de cette composition ainsi que son utilisation notamment en tant que produit capillaire rincé.

10

15

Pour le nettoyage et/ou le lavage des cheveux, l'utilisation de compositions capillaires détergentes (ou shampooings), à base essentiellement d'agents tensioactifs classiques de types notamment anionique, non-ionique et/ou amphotère, mais plus particulièrement de type anionique, est courante. Ces compositions sont appliquées sur cheveux mouillés et la mousse générée par massage ou friction avec les mains permet, après rinçage à l'eau, l'élimination des diverses salissures initialement présentes sur les cheveux.

20

25

Ces compositions de base possèdent certes un bon pouvoir lavant, mais les propriétés cosmétiques intrinsèques qui leur sont attachées restent toutefois assez faibles, notamment en raison du fait que le caractère relativement agressif d'un tel traitement de nettoyage peut entraîner à la longue sur la fibre capillaire des dommages plus ou moins marqués liés en particulier à l'élimination progressive des lipides ou protéines contenues dans ou à la surface de cette dernière.

30

Aussi, pour améliorer les propriétés cosmétiques des compositions ci-dessus, et plus particulièrement de celles qui sont appelées à être appliquées sur des cheveux sensibilisés (i.e. des cheveux qui se trouvent abîmés ou fragilisés notamment sous l'action chimique des agents atmosphériques et/ou de traitements capillaires tels que permanentes, teintures ou décolorations), il est maintenant usuel d'introduire dans ces dernières des agents cosmétiques



complémentaires dits agents conditionneurs destinés principalement à réparer ou limiter les effets néfastes ou indésirables induits par les différents traitements ou agressions que subissent, de manière plus ou moins répétés, les fibres capillaires. Ces agents conditionneurs peuvent bien entendu également améliorer le
5 comportement cosmétique des cheveux naturels.

Les agents conditionneurs les plus couramment utilisés à ce jour dans des shampoings sont les polymères cationiques, les silicones et/ou les dérivés de silicone, qui confèrent en effet aux cheveux lavés, secs ou mouillés, une facilité de
10 démêlage et une douceur nettement accrue par rapport à ce qui peut être obtenu avec les compositions nettoyantes correspondantes qui en sont exemptes.

Cependant, ces avantages cosmétiques s'accompagnent malheureusement également, sur cheveux séchés, de certains effets cosmétiques jugés
15 indésirables, à savoir un alourdissement de la coiffure, un manque de lissage.

En outre, l'usage des polymères cationiques dans ce but présente divers inconvénients. En raison de leur forte affinité pour les cheveux, certains de ces polymères se déposent de façon importante lors d'utilisations répétées, et
20 conduisent à des effets indésirables tel qu'un toucher désagréable, chargé, un raidissement des cheveux, et une adhésion entre les fibres affectant le coiffage. Ces inconvénients sont accentués dans le cas de cheveux fins, qui manquent de nervosité et de volume.

25 Il a déjà été proposé l'utilisation de particules dans des compositions rincées, de façon à améliorer le toucher et l'aspect des cheveux. A titre d'illustration, le brevet US 5 334 376 propose l'ajout de particules de carbonate de calcium dans des compositions de conditionnement des cheveux contenant une silicone, un alcool gras et une amide.

30

Dans la demande de brevet DE 199 46 784, il a également été proposé l'utilisation de particules de différents oxydes, hydroxydes, carbonates, silicates ou phosphates, dans des compositions capillaires, pour réduire l'aspect gras des

cheveux. Il est prévu, en toutes généralités, d'associer ces particules aux ingrédients classiques des shampoings.

- 5 Toutefois, et malgré les progrès réalisés récemment dans le domaine des produits capillaires rincés et notamment des shampoings, ces derniers ne donnent pas vraiment complètement satisfaction, de sorte qu'un fort besoin existe encore actuellement quant à pouvoir disposer de nouveaux produits présentant, au niveau de l'une ou de plusieurs de leurs propriétés, de meilleures performances.
- 10 La Demanderesse a découvert, de manière surprenante et inattendue, qu'en choisissant l'agent de conditionnement, associé avec des particules minérales particulières, il était possible d'améliorer les résultats obtenus avec les produits cosmétiques, notamment capillaires rincés, en terme de propriétés cosmétiques et de mise en forme. En particulier, on apporte de la texture aux cheveux (sensation
- 15 d'épaisseur accrue) et une meilleure tenue de la coiffure.

L'invention a pour objet une composition cosmétique, notamment capillaire, comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable :

- 20 (a) des particules solides minérales comprenant au moins un élément des colonnes IIa, IIIa et IVa du tableau de classification périodique des éléments et, (b) au moins une polyalkylèneimine .

- 25 Un autre objet de la présente invention consiste en un procédé de traitement cosmétique des cheveux mettant en œuvre la composition selon l'invention.

L'invention a encore pour objet l'utilisation de la composition pour apporter de la texture aux cheveux (sensation d'épaisseur accrue) et une meilleure tenue de la coiffure.

30

L'invention a encore pour objet l'utilisation de la composition en cosmétique capillaire, notamment en application capillaire rincée, notamment comme shampoing.

D'autres objets, caractéristiques, aspects et avantages de l'invention apparaîtront encore plus clairement à la lecture de la description et des divers exemples qui suivent.

5 (a) PARTICULES MINÉRALES

Les particules minérales solides comprennent au moins un élément des colonnes IIa, IIIa et IVa du tableau de classification périodique des éléments et de préférence des colonnes IIa et IVa. Elles sont notamment choisies parmi les
10 particules contenant au moins 10 % en poids de carbonate de calcium ou d'au moins un silicate, les particules contenant au moins 90% d'oxyde d'aluminium, les silices, l'oxyde de magnésium, le sulfate de baryum et leurs mélanges.

Les particules minérales solides présentent, de préférence, une taille
15 primaire moyenne en nombre comprise entre 2 nm et 2 μ m, plus préférentiellement entre 5 et 500 nm, et plus préférentiellement encore entre 10 et 250 nm.

Les particules selon l'invention peuvent, par exemple, avoir une forme
20 quelconque, par exemple la forme de sphères, de paillettes, d'aiguilles, de plaquettes ou des formes totalement aléatoires. De préférence, elles sont sensiblement sphériques.

Au sens de la présente invention, on entend par "*taille primaire de particule*", la
25 dimension maximale qu'il est possible de mesurer entre deux points diamétralement opposés d'une particule individuelle. La taille peut être déterminée, par exemple, par microscopie électronique à transmission ou à partir de la mesure de la surface spécifique par la méthode BET ou bien par
l'intermédiaire d'un granulomètre laser.

30

Conformément à la présente invention, la particule peut être une particule massique formée entièrement de carbonate de calcium. Le carbonate de calcium peut également constituer totalement ou partiellement le cœur de la particule, ce dernier étant recouvert d'un autre constituant, comme par exemple, un oxyde, un

silicate ou un métal. Le carbonate de calcium peut encore former uniquement le revêtement d'un substrat de constitution chimique différente, comme par exemple un oxyde, un silicate ou un métal.

- 5 Dans le cas où les particules sont formées par du carbonate de calcium et d'autres charges, le carbonate de calcium se trouve à l'état libre et ne forme pas de liaisons chimiques avec les autres charges. Il s'agit alors d'un alliage entre le carbonate de calcium et d'autres charges, notamment avec des oxydes de métaux ou de métalloïdes, en particulier obtenu par fusion thermique de ces différents
- 10 constituants.

Lorsque les particules contenant au moins 10 % en poids de carbonate de calcium comprennent, en outre, un oxyde de métal ou de métalloïde, celui-ci est notamment choisi parmi l'oxyde de silicium, de bore ou d'aluminium.

15

De préférence, les particules contiennent au moins 50 % en poids de carbonate de calcium, mieux encore au moins 70 % en poids, et les particules constituées à plus de 90 % en poids de carbonate de calcium sont particulièrement préférées selon la présente invention.

20

Plus avantageusement encore, les particules contenant au moins 10 % en poids de carbonate de calcium sont des particules de carbonate de calcium substantiellement pur.

- 25 Le carbonate de calcium convenant dans les compositions de la présente invention peut être d'origine naturelle ou peut être d'origine synthétique. Dans ce dernier cas, il peut être obtenu à partir d'oxyde de calcium, de peroxyde de calcium, d'acétate ou d'éthylate de calcium.

- 30 Les particules d'oxyde d'aluminium selon l'invention sont essentiellement constituées par une quelconque alumine éventuellement hydratée telle que, par exemple, la boehmite.

Les silicates utilisables selon l'invention peuvent être choisis parmi les silicates de sodium, de magnésium et/ou de lithium, On peut notamment utiliser les composés



commercialisés par la société LAPORTE sous la dénomination LAPONITE XLG et LAPONITE XLS.

5 Lorsque les particules contenant au moins 10% en poids d'au moins un silicate comprennent en outre un oxyde de métal ou de métalloïde, celui-ci est notamment choisi parmi l'oxyde de silicium, de bore ou d'aluminium.

Les silicates convenant dans les compositions de la présente invention peuvent être d'origine naturelle ou d'origine synthétique.

10

Les particules minérales selon l'invention sont, notamment, utilisées en une quantité comprise entre 0,01 % et 30 % en poids, et de préférence entre 0,05 % et 10 % en poids, et plus particulièrement entre 0,1 % et 5 % en poids par rapport au poids total de la composition.

15


La composition selon l'invention peut également contenir d'autres types de particules, par exemple, des particules d'oxyde de titane ou de zinc.

(b)POLYALKYLENEIMINE

20

Les polyalkylèneimines utilisées préférentiellement selon l'invention sont des polymères contenant de 6 à 20.000 motifs de répétition. De préférence, on choisit des polyalkylène imines comprenant au moins 5% d'amines tertiaires, avantageusement au moins 10% de fonctions amines tertiaires, et encore plus
25 préférentiellement au moins 20%. Ces polymères peuvent être des homopolymères ou des copolymères, linéaires, branchés ou de structures dendrimériques.

Ces polymères comprennent les motifs répétitifs suivants :




30

dans lesquels :

i représente un entier supérieur ou égal à 2 et de préférence inférieur ou égal à 6, préférentiellement $i=2$;

n représente un entier variant de 6 à 20.000 et de préférence de 8 à 2500

R représente un atome d'hydrogène ou un motif



dans lequel m représente un entier supérieur ou égal à 2, préférentiellement m=2 ;

5

Ces polymères sont généralement terminés par des fonction amines terminales notamment des amines primaires.

Selon l'invention, les polyalkylèneimines sont de préférence des polyalkylène(C2-C4)imines et plus particulièrement des polyéthylèneimines.

10

Les polyalkylèneimines utilisées conformément à l'invention ont en général un poids moléculaire moyen en poids compris entre 300 et 100.000 et de préférence entre 350 et 50.000 et plus particulièrement entre 400 et 10.000.

15

Les poids moléculaires sont déterminés par diffusion quasi élastique de la lumière.

Les polyalkylèneimines ont de préférence une densité de charge cationique inférieure ou égale à 20 meq/g et, de préférence, supérieure ou égale à 0,05meq/g.

20

La densité de charge peut être déterminée selon la méthode Kjeldahl ou calculée.

Les polyalkylèneimines sont notamment décrites dans l'ouvrage "Polymer Science dictionary" 2^{ème} édition, Mark ALGER, CHAPMAN & HALL, 1997.

25

Les polyalkylèneimines sont présents, dans les compositions selon l'invention, dans des proportions allant, de préférence, de 0,0005 à 5 % en poids et de préférence de 0,001 à 1 % en poids par rapport au poids total de la composition et plus particulièrement de 0,005 à 0,5% en poids et encore plus préférentiellement de 0,005 à 0,25% en poids.

30

La ou les polyalkylènesimines peuvent être alors utilisées en un rapport pondéral avec les particules minérales compris entre 0,1 et 0,0001 de préférence entre 0,05 et 0,001.

- 5 Les compositions de l'invention comprennent de préférence en outre au moins un tensioactif qui est généralement présent en une quantité comprise entre 0,2% et 40% en poids environ, de préférence entre 1% et 35% et encore plus préférentiellement entre 1,5 % et 30%, par rapport au poids total de la composition.

10

Les tensioactifs convenant à la mise en oeuvre de la présente invention peuvent être de toute nature et de préférence sont solubles dans l'eau à température ambiante :

- 15 (i) Tensioactif(s) anionique(s) :

Leur nature ne revêt pas, dans le cadre de la présente invention, de caractère véritablement critique.

- Ainsi, à titre d'exemple de tensioactifs anioniques utilisables, seuls ou en mélanges, dans le cadre de la présente invention, on peut citer notamment (liste non limitative) les sels (en particulier sels alcalins, notamment de sodium, sels d'ammonium, sels d'amines, sels d'aminoalcools ou sels de magnésium) des composés suivants : les alkyl sulfates, les alkyl éther sulfates, alkyl amido éther sulfates, alkyl aryl polyéther sulfates, monoglycérides sulfates ; les alkyl sulfonates, alkylphosphates, alkyl amido sulfonates, alkyl aryl sulfonates, α -
20 oléfine-sulfonates, paraffine-sulfonates ; les alkyl sulfo succinates, les alkyl éther sulfosuccinates, les alkyl amide sulfosuccinates; les alkylsulfo succinamates ; les alkylsulfoacétates ; les alkylétherphosphates; les acylsarcosinates ; les acyliséthionates et les N-acyltaurates, le radical alkyle ou acyle de tous ces différents composés comportant de préférence de 8 à 24 atomes de carbone, et le
25 radical aryl désignant de préférence un groupement phényle ou benzyle. Parmi les tensioactifs anioniques encore utilisables, on peut également citer les sels d'acides gras tels que les sels des acides oléique, ricinoléique, palmitique, stéarique, les acides d'huile de coprah ou d'huile de coprah hydrogénée ; les acyl-lactylates dont le radical acyle comporte 8 à 20 atomes de carbone. On peut
30

également utiliser des tensioactifs faiblement anioniques, comme les acides d'alkyl D galactoside uroniques et leurs sels ainsi que les acides alkyl (C_6-C_{24}) éther carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl(C_6-C_{24})aryl éther carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkylamido(C_6-C_{24}) éther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux comportant de 2 à 50 groupements oxyde d'éthylène, et leurs mélanges.

Parmi les tensioactifs anioniques, on préfère utiliser selon l'invention les sels d'alkylsulfates et d'alkyléthersulfates et leurs mélanges.

10

(ii) Tensioactif(s) non ionique(s) :

Les agents tensioactifs non-ioniques sont, eux aussi, des composés bien connus en soi (voir notamment à cet égard "Handbook of Surfactants" par M.R. PORTER, éditions Blackie & Son (Glasgow and London), 1991, pp 116-178) et leur nature ne revêt pas, dans le cadre de la présente invention, de caractère critique. Ainsi, ils peuvent être notamment choisis parmi (liste non limitative) les alcools, les alpha-diols, les alkylphénols ou les acides gras polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés ayant une chaîne grasse comportant par exemple 8 à 18 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50 et le nombre de groupements glycérol pouvant aller notamment de 2 à 30. On peut également citer les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras ; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4; les esters d'acides gras du sorbitan oxyéthylénés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène ; les esters d'acides gras du sucrose, les esters d'acides gras de polyéthylèneglycol, les alkylpolyglycosides, les dérivés de N-alkyl glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl ($C_{10}-C_{14}$) amines ou les oxydes de N-acylaminopropylmorpholine. On notera que les alkylpolyglycosides constituent des tensioactifs non-ioniques rentrant particulièrement bien dans le cadre de la présente invention.

30

(iii) Tensioactif(s) amphotère(s) ou zwitterionique(s) :




Les agents tensioactifs amphotères ou zwitterioniques, dont la nature ne revêt pas dans le cadre de la présente invention de caractère critique, peuvent être notamment (liste non limitative) des dérivés d'amines secondaires ou tertiaires aliphatiques, dans lesquels le radical aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant 8 à 18 atomes de carbone et contenant au moins un groupe anionique hydrosolubilisant (par exemple carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate) ; on peut citer encore les alkyl (C_8-C_{20}) bétaines, les sulfobétaines, les alkyl (C_8-C_{20}) amidoalkyl (C_1-C_6) bétaines ou les alkyl (C_8-C_{20}) amidoalkyl (C_1-C_6) sulfobétaines.

10


Parmi les dérivés d'amines, on peut citer les produits commercialisés sous la dénomination MIRANOL, tels que décrits dans les brevets US-2528378 et US-2781354 et classés dans le dictionnaire CTFA, 3ème édition, 1982, sous les dénominations Amphocarboxy-glycinates et Amphocarboxypropionates de structures respectives :

15



dans laquelle : R_2 désigne un radical alkyle d'un acide $R_2\text{-COOH}$ présent dans l'huile de coprah hydrolysée, un radical heptyle, nonyle ou undécyle, R_3 désigne un groupement bêta-hydroxyéthyle et R_4 un groupement carboxyméthyle ;

20 et



dans laquelle :

B représente $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OX}'$, C représente $-(\text{CH}_2)_z-\text{Y}'$, avec $z = 1$ ou 2 ,

25

X' désigne le groupement $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-COOH}$ ou un atome d'hydrogène

Y' désigne $-\text{COOH}$ ou le radical $-\text{CH}_2\text{-CHOH-SO}_3\text{H}$

R_2' désigne un radical alkyle d'un acide $R_9\text{-COOH}$ présent dans l'huile de coprah ou dans l'huile de lin hydrolysée, un radical alkyle, notamment en C_7 , C_9 , C_{11} ou C_{13} , un radical alkyle en C_{17} et sa forme iso, un radical C_{17} insaturé.


30

A titre d'exemple on peut citer le cocoamphodiacetate commercialisé sous la dénomination commerciale MIRANOL C2M concentré NP par la Société RHODIA CHIMIE.

(iv) Tensioactifs cationiques :

Les tensioactifs cationiques peuvent être choisis parmi :

A) les sels d'ammonium quaternaires de la formule générale (XII) suivante :



5 dans laquelle X^- est un anion choisi dans le groupe des halogénures (chlorure, bromure ou iodure) ou alkyl(C_2 - C_6)sulfates plus particulièrement méthylsulfate, des phosphates, des alkyl-ou-alkylarylsulfonates, des anions dérivés d'acide organique tel que l'acétate ou le lactate.

, et

10 i) les radicaux R_1 à R_3 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent un radical aliphatique, linéaire ou ramifié, comportant de 1 à 4 atomes de carbone, ou un radical aromatique tel que aryle ou alkylaryle. Les radicaux aliphatiques peuvent comporter des hétéroatomes tels que notamment l'oxygène, l'azote, le soufre, les halogènes. Les radicaux aliphatiques sont par
15 exemple choisis parmi les radicaux alkyle, alcoxy, alkylamide, R_4 désigne un radical alkyle, linéaire ou ramifié, comportant de 16 à 30 atomes de carbone.

De préférence le tensioactif cationique est un sel (par exemple chlorure) de cétyle triméthyle ammonium.

20

ii) les radicaux R_1 et R_2 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent un radical aliphatique, linéaire ou ramifié, comportant de 1 à 4 atomes de carbone, ou un radical aromatique tel que aryle ou alkylaryle. Les radicaux aliphatiques peuvent comporter des hétéroatomes tels que notamment
25 l'oxygène, l'azote, le soufre, les halogènes. Les radicaux aliphatiques sont par exemple choisis parmi les radicaux alkyle, alcoxy, alkylamide et hydroxyalkyle, comportant environ de 1 à 4 atomes de carbone;

R_3 et R_4 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle, linéaire ou ramifié, comportant de 12 à 30 atomes de carbone, ledit radical comprenant au moins une


30 fonction ester ou amide.

R3 et R4 sont notamment choisis parmi les radicaux alkyl(C₁₂-C₂₂)amido alkyle(C₂-C₆), alkyl(C₁₂-C₂₂)acétate ;

De préférence le tensioactif cationique est un sel (par exemple chlorure) de stéaramidopropyl diméthyl (myristylacétate) ammonium.


5

B) - les sels d'ammonium quaternaire de l'imidazolinium, comme par exemple celui de formule (XIII) suivante :



dans laquelle R₅ représente un radical alcényle ou alkyle comportant de 8 à 30
 10 atomes de carbone par exemple dérivés des acides gras du suif, R₆ représente un
 atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou un radical alcényle ou alkyle
 comportant de 8 à 30 atomes de carbone, R₇ représente un radical alkyle en C₁-
 C₄, R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, X est un
 anion choisi dans le groupe des halogénures, phosphates, acétates, lactates,
 15 alkylsulfates, alkyl-ou-alkylarylsulfonates. De préférence, R₅ et R₆ désignent un
 mélange de radicaux alcényle ou alkyle comportant de 12 à 21 atomes de carbone
 par exemple dérivés des acides gras du suif, R₇ désigne méthyle, R₈ désigne
 hydrogène. Un tel produit est par exemple le Quaternium-27(CTFA 1997) ou le
 Quaternium-83 (CTFA 1997) commercialisés sous les dénominations
 20 "REWOQUAT" W 75, W90, W75PG, W75HPG par la société WITCO,


C) - les sels de diammonium quaternaire de formule (XIV) :



dans laquelle R₉ désigne un radical aliphatique comportant environ de 16 à 30
 25 atomes de carbone, R₁₀, R₁₁, R₁₂, R₁₃ et R₁₄, identiques ou différents sont choisis
 parmi l'hydrogène ou un radical alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone, et
 X est un anion choisi dans le groupe des halogénures, acétates, phosphates,

nitrates et méthylsulfates. De tels sels de diammonium quaternaire comprennent notamment le dichlorure de propanesulfate de diammonium.

D) - les sels d'ammonium quaternaire contenant au moins une fonction ester
5 de formule (XV) suivante :



dans laquelle :

- R₁₅ est choisi parmi les radicaux alkyles en C₁-C₆ et les radicaux hydroxyalkyles ou dihydroxyalkyles en C₁-C₆ ;

10 - R_{16} est choisi parmi :

- le radical $R_{19}-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$

- les radicaux R₂₀ hydrocarbonés en C₁-C₂₂ linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés,

- l'atome d'hydrogène,

15 - R_{18} est choisi parmi :

- le radical $R_{21}-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$

- les radicaux R₂₂ hydrocarbonés en C₁-C₆ linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés,

- l'atome d'hydrogène,

20 - R₁₇, R₁₉ et R₂₁, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux hydrocarbonés en C₇-C₂₁, linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés ;

- n , p et r , identiques ou différents, sont des entiers valant de 2 à 6 ;

- y est un entier valant de 1 à 10 ;

- x et z, identiques ou différents, sont des entiers valant de 0 à 10 ;

25 - X⁻ est un anion simple ou complexe, organique ou inorganique ;

sous réserve que la somme $x + y + z$ vaut de 1 à 15, que lorsque x vaut 0 alors R_{16} désigne R_{20} et que lorsque z vaut 0 alors R_{18} désigne R_{22} .

On utilise plus particulièrement les sels d'ammonium de formule (XV) dans laquelle :

- 5
 - R_{15} désigne un radical méthyle ou éthyle,
 - x et y sont égaux à 1 ;
 - z est égal à 0 ou 1 ;
 - n , p et r sont égaux à 2 ;
- 10
 - R_{16} est choisi parmi :
 - le radical $R_{19}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$
 - les radicaux méthyle, éthyle ou hydrocarbonés en $C_{14}-C_{22}$
 - l'atome d'hydrogène ;
 - R_{17} , R_{19} et R_{21} , identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux
- 15
 - hydrocarbonés en C_7-C_{21} , linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés ;
 - R_{18} est choisi parmi :
 - le radical $R_{21}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$
 - l'atome d'hydrogène ;
- 20

De tels composés sont par exemple commercialisés sous les dénominations DEHYQUART par la société COGNIS, STEPANQUAT par la société STEPAN, NOXAMIUM par la société CECA, REWOQUAT WE 18 par la société REWO-WITCO.
- 25

Parmi les sels d'ammonium quaternaire on préfère le chlorure de cétyltriméthylammonium, le chlorure de béhényl triméthylammonium ou encore, le chlorure palmitamidopropyl triméthyl ammonium commercialisé sous la dénomination VARISOFT PA TC par la société GOLDSCHMIDT.
- 30

On utilise de préférence comme agent tensioactif anionique les alkyl($C_{12}-C_{14}$) sulfates de sodium, de triéthanolamine ou d'ammonium, les alkyl ($C_{12}-$

C₁₄)éthersulfates de sodium, de triéthanolamine ou d'ammonium oxyéthylénés à 2,2 moles d'oxyde d'éthylène, le cocoyl iséthionate de sodium et l'alphaoléfine(C₁₄-C₁₆) sulfonate de sodium et leurs mélanges avec :

- 5 - soit un agent tensioactif amphotère tel que les dérivés d'amine dénommés disodiumcocoamphodiacetate ou sodiumcocoamphopropionate commercialisés notamment par la société RHODIA CHIMIE sous la dénomination commerciale "MIRANOL® C2M CONCNP" en solution aqueuse à 38 % de matière active ou sous la dénomination MIRANOL® C32;
- 10 - soit un agent tensioactif amphotère tel que les alkylbétaines en particulier la cocobétaïne commercialisée sous la dénomination "DEHYTON® AB 30" en solution aqueuse à 32 % de MA par la société COGNIS ou tel que les alkyl (C₈-C₂₀) amidoalkyl (C₁-C₆) bétaines en particulier la TEGOBETAINE® F 50 commercialisée par la société GOLDSCHMIDT.

- 15 Le milieu cosmétiquement acceptable peut être constitué uniquement par de l'eau ou par un mélange d'eau et d'un ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables ou par un ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables, tel qu'un alcool inférieur en C₁-C₄, comme l'éthanol, l'isopropanol, le tertibutanol, le n-butanol; les alkylèneglycols comme le propylèneglycol, les éthers de glycols.
- 20 L'eau représente de préférence de 30 à 98% en poids et de préférence de 50 à 98% en poids par rapport au poids total de la composition.

- On peut citer plus particulièrement les monoalcools tels que l'éthanol, l'isopropanol, les polyalcools tels que le diéthylèneglycol, la glycérine, les éthers
- 25 de glycol, les alkyléthers de glycol ou de diéthylèneglycol.

- Les compositions selon l'invention présentent un pH final généralement compris entre 3 et 10. De préférence, ce pH est compris entre 4 et 8. L'ajustement du pH à la valeur désirée peut se faire classiquement par ajout d'une base (organique ou
- 30 minérale) dans la composition, par exemple de l'ammoniaque ou une (poly)amine primaire, secondaire ou tertiaire comme la monoéthanolamine, la diéthanolamine, la triéthanolamine, l'isopropanolamine ou la propanediamine-1,3, ou encore par

ajout d'un acide, de préférence un acide carboxylique tel que par exemple l'acide citrique.

Les compositions conformes à l'invention peuvent contenir en plus de l'association
5 définie ci-dessus des agents régulateurs de viscosité tels que des électrolytes, ou
des agents épaississants (associatifs ou non associatifs). On peut citer en
particulier le chlorure de sodium, le xylène sulfonate de sodium, les
scléroglycanes, les gommes de xanthane, les alcanolamides d'acide gras, les
alcanolamides d'acide alkyl éther carboxylique éventuellement oxyéthylénés avec
10 jusqu'à 5 moles d'oxyde d'éthylène tel que le produit commercialisé sous la
dénomination "AMINOL A15" par la société CHEM Y, les acides polyacryliques
réticulés et les copolymères acide acrylique / acrylates d'alkyle en C₁₀-C₃₀
réticulés. Ces agents régulateurs de viscosité sont utilisés dans les compositions
selon l'invention dans des proportions pouvant aller jusqu'à 10 % en poids par
15 rapport au poids total de la composition.

Les compositions conformes à l'invention peuvent également contenir, de
préférence, jusqu'à 5 % d'agents nacrants ou opacifiants bien connus dans l'état
de la technique tels que par exemple les alcools gras supérieurs à C₁₆, les
20 dérivés acylés à chaîne grasse tels que les monostéarates ou distéarates
d'éthylène glycol ou de polyéthylène glycol, les éthers à chaînes grasses tels que
par exemple le distéaryléther ou le 1-(hexadécyloxy)-2-octadécanol.

Les compositions conformes à l'invention peuvent éventuellement contenir, en
25 outre, au moins un additif choisi parmi les synergistes de mousses tels que des
1,2-alcanediols en C₁₀-C₁₈ ou des alcanolamides gras dérivés de mono ou de
diéthanolamine, les filtres solaires siliconés ou non, les polymères anioniques,
non ioniques, amphotères ou cationiques autres que les polyalkylèneamines de
l'invention, les protéines, les hydrolysats de protéines, les hydroxyacides, les
30 vitamines, les provitamines tels que le panthénol, les silicones volatiles ou non,
linéaires ou cycliques, réticulées ou non, organomodifiées ou non, les huiles de
synthèse telles que les poly- α -oléfinés, les huiles fluorées, les cires fluorées, les
gommes fluorées, les esters d'acides carboxyliques, les huiles minérales,
végétales ou animales, les céramides, les pseudocéramides et leurs mélanges.

Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires et/ou leurs quantités de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à l'association conforme à l'invention ne
5 soient pas ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

Ces additifs sont, éventuellement, présents dans la composition selon l'invention dans des proportions pouvant aller de 0,00001 à 20% en poids par rapport au
10 poids total de la composition. La quantité précise de chaque additif est déterminée facilement par l'homme du métier selon sa nature et sa fonction.

Les compositions peuvent se présenter sous forme de liquides fluides ou épaissis, de gels, de crèmes, de mousses, d'émulsions eau-dans l'huile (E/H),
15 huile-dans-eau (H/E) ou d'émulsions multiples.

Elles peuvent être utilisées, par exemple, comme shampoings, soins rincés, masques de soin profond, lotions ou crèmes de traitement du cuir chevelu.

20 Ces compositions conviennent principalement au lavage, au soin des matières kératiniques en particulier des cheveux et de la peau et encore plus particulièrement des cheveux.

Les compositions de l'invention peuvent plus particulièrement se présenter sous forme de shampoing, d'après-shampoing à rincer ou non, de compositions pour
25 permanente, défrisage, coloration ou décoloration, ou encore sous forme de compositions à appliquer avant ou après une coloration, une décoloration, une permanente ou un défrisage ou encore entre les deux étapes d'une permanente ou d'un défrisage. De préférence, les compositions sont des compositions lavantes et moussantes pour les cheveux et/ou la peau.

30

En particulier, les compositions selon l'invention sont des compositions détergentes moussantes telles que des shampoings, des gels-douche et des bains moussants. Dans ce mode de réalisation de l'invention, les compositions comprennent au moins un tensioactif détergent.

Le ou les tensioactifs détergents peuvent être indifféremment choisis, seuls ou en mélanges, au sein des tensioactifs anioniques, amphotères, non ioniques, zwitterioniques et cationiques décrits ci-dessus.

5

La quantité minimale tensioactif est celle juste suffisante pour conférer à la composition finale un pouvoir moussant et/ou détergent satisfaisant.

Ainsi, selon l'invention, le tensioactif détergent peut représenter de 3 % à 30 % en poids, de préférence de 6 % à 25 % en poids, et encore plus préférentiellement de

10 8 % à 20 % en poids, du poids total de la composition finale.

Lorsque les compositions conformes à l'invention sont mises en oeuvre comme des shampoings classiques, elles sont simplement appliquées sur cheveux mouillés et la mousse générée par massage ou friction avec les mains est ensuite
15 éliminée, après un éventuel temps de pause, par rinçage à l'eau, l'opération pouvant être répétée une ou plusieurs fois.

L'invention a également pour objet un procédé de lavage et de conditionnement des matières kératiniques, telles que notamment les cheveux, consistant à
20 appliquer une composition telle que définie ci-dessus, puis à effectuer un rinçage à l'eau après un éventuel temps de pause.

Les compositions selon l'invention sont utilisées, de préférence, comme shampoings pour le lavage et le conditionnement des cheveux et ils sont
25 appliqués dans ce cas-là sur les cheveux humides dans des quantités efficaces pour les laver, cette application étant suivie d'un rinçage à l'eau.

Les compositions conformes à l'invention sont également utilisables comme gel-douche pour le lavage et le conditionnement des cheveux et/ou de la peau, auquel
30 cas ils sont appliqués sur la peau et/ou les cheveux humides et sont rincés après application.

Les compositions de l'invention peuvent également être utilisées en non rincé, et en particulier dans des lotions, dans des gels, dans des mousses, dans des aérosols.

- 5 Des exemples concrets, mais nullement limitatif, illustrant l'invention vont maintenant être donnés.

EXEMPLE 1:

- 10 On a réalisé la composition de shampooing ci-après :

Lauryl sulfate de triéthanolamine en solution aqueuse			
	à 40 % MA	31,2 g	
Alkyl (C1/C9) polyglucoside [1,4] en solution			
15	aqueuse à 40 %).....	6,25 g	
	Polyéthylèneimine (LUPASOL FG de BASF)	0,015 g	
Carbonate de calcium en poudre (OMYAPUR 35			
	commercialisé par OMYA).....	3 g	
	Agent de pH	qsp	pH=7
20	Eau	qsp	100 g

La composition présente une texture agréable lors de l'application sur des cheveux humides. Sa rinçabilité est bonne. Les cheveux mouillés ne sont pas chargés et la mise en forme est aisée.

25

EXEMPLE 2:

On a réalisé la composition de shampooing ci-après :

Lauryl éthersulfate de sodium en solution aqueuse			
30	à 30% MA	17,8 g	
Cocoyl amidopropyl bétaine en solution aqueuse			
	à 30 % MA.	8,3 g	
	Polyéthylèneimine (LUPASOL FG de BASF)	0,015 g	
Laponite en poudre LAPONITE XLG			

Agent de pH	qsp	pH=7	
Eau	qsp		100 g

	Exemple 3 avec carbonate de calcium	Comparatif (sans PEI)
--	-------------------------------------	-----------------------

Forces de frottement	30,8 g	25,2 g
----------------------	--------	--------

La force de glissement de la composition contenant le carbonate de calcium et la polyéthylèneimine (PEI) selon l'invention est nettement supérieure à celle de la composition sans PEI.

5

EXEMPLE 4:

On a réalisé la lotion ci-après :

10	Polyéthylèneimine (LUPASOL FG de BASF)	0,015 g
	Laponite (Silicate mixte sodium lithium magnésium) en poudre LAPONITE XLG de LAPORTE)	3 g
	Agent de pH	qsp
		pH=7
	Eau	qsp
		100 g

15

On a mesuré les forces de frottement sur mèches de cheveux naturels séchés à l'aide d'un banc de glissement.

20 Une mèche mobile, fixée sur un banc de glissement, est entraînée dans un mouvement rectiligne horizontal entre deux autres mèches fixes. La force à exercer pour faire glisser la mèche est mesurée à l'aide d'une jauge électronique reliée au bras d'entraînement. Plus la force de glissement est importante, plus les effets du dépôt des particules est important. L'effet coiffant est renforcé.

25

Les résultats sont rassemblés dans le tableaux ci-dessous :


	Exemple 4 avec Laponite	Comparatif (sans PEI)
Forces de frottement	25,7 g	19,3 g

La force de glissement de la composition contenant la laponite et la polyéthylèneimine (PEI) selon l'invention est nettement supérieure à celle de la composition sans PEI.

REVENDICATIONS

- 5 1. Composition cosmétique, notamment capillaire, comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable :
- des particules minérales solides comprennent au moins un élément des colonnes IIa, IIIa et IVa du tableau de classification périodique des éléments et
 - au moins une polyalkylèneimine.
- 10 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les particules solides présentent une taille primaire moyenne en nombre comprise entre 2 nm et 2 microns, plus préférentiellement entre 5 et 500 nm, et plus préférentiellement encore entre 10 et 250 nm.
- 15 3. Composition selon la revendication selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les particules sont choisies parmi les particules contenant au moins 10 % en poids de carbonate de calcium ou d'au moins un silicate, les particules contenant au moins 90% d'oxyde d'aluminium, les silices, l'oxyde de magnésium, le sulfate de baryum et leurs
- 20 mélanges.
4. Composition selon la revendication 3, caractérisée par le fait que les particules contiennent au moins 50 % en poids de carbonate de calcium, mieux encore au moins 70 % en poids, et encore mieux plus de 90 % en poids de carbonate de
- 25 calcium.
5. Composition selon la revendication précédente, caractérisée par le fait que les particules sont des particules de carbonate de calcium substantiellement pur.
- 30 6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les particules solides sont utilisées en une quantité comprise entre 0,01 % et 30 % en poids, et de préférence entre 0,05 % et 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les polyalkylèneimines comprennent les motifs répétitifs suivants :




5 dans lesquels :

i représente un entier supérieur ou égal à 2, préférentiellement $i=2$;

n représente un entier variant de 6 à 20.000 et de préférence de 8 à 2500,

R représente un atome d'hydrogène ou un motif



10 dans lequel m représente un entier supérieur ou égal à 2, préférentiellement $m=2$;

8. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que la ou lesdites polyalkylèneimines sont des polyalkylène(C2-C4)imines et plus particulièrement des polyéthylèneimines.

15

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que la ou lesdites polyalkylèneimines ont un poids moléculaire moyen en poids compris entre 300 et 100.000.

20


10. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait que la ou lesdites polyalkylèneimines sont présentes dans des proportions allant de 0,0001 à 5 % en poids et, de préférence, de 0,001 à 1 % en poids par rapport au poids total de la composition et plus particulièrement de 0,005 à 0,25% en poids.

25

11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins un additif choisi parmi les synergistes de mousses tels que des 1,2-alcanediols en C_{10} - C_{18} ou des alcanolamides gras dérivés de mono ou de diéthanoline, les filtres solaires siliconés ou non, les agents tensioactifs autres que ceux de l'invention, les

30

7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les polyalkylèneimines comprennent les motifs répétitifs suivants :




5 dans lesquels :

i représente un entier supérieur ou égal à 2 , préférentiellement $i=2$;

n représente un entier variant de 6 à 20.000 et de préférence de 8 à 2500,

R représente un atome d'hydrogène ou un motif



10 dans lequel m représente un entier supérieur ou égal à 2, préférentiellement $m=2$;

8. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que la ou lesdites polyalkylèneimines sont des polyalkylène(C2-C4)imines et plus particulièrement des polyéthylèneimines.

15

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que la ou lesdites polyalkylèneimines ont un poids moléculaire moyen en poids compris entre 300 et 100.000.

20 10. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait que la ou lesdites polyalkylèneimines sont présentes dans des proportions allant de 0,0005 à 5 % en poids et, de préférence, de 0,001 à 1 % en poids par rapport au poids total de la composition et plus particulièrement de 0,005 à 0,25% en poids.

25

11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins un additif choisi parmi les synergistes de mousses tels que des 1,2-alcanediols en C_{10} - C_{18} ou des alcanolamides gras dérivés de mono ou de diéthanolamine, les filtres solaires
30 siliconés ou non, les agents tensioactifs autres que ceux de l'invention, les

polymères anioniques, non ioniques, amphotères ou cationiques différents des polyalkylène imines; les protéines, les hydrolysats de protéines, les hydroxyacides, les vitamines, les provitamines tels que le panthénol, les silicones volatiles ou non, linéaires ou cycliques, réticulées ou non, organomodifiées ou non.

12. Utilisation d'une composition telle définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 11 comme shampooing.

10 13. Utilisation d'une composition telle définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour apporter de la texture aux cheveux (sensation d'épaisseur accrue) et une meilleure tenue de la coiffure.

15 14. Procédé de lavage et de conditionnement des cheveux consistant à appliquer une quantité efficace d'une composition telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 10, puis à effectuer un rinçage à l'eau après un éventuel temps de pose.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ... / ...

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

V s références pour ce dossier (facultatif)		OA02394/BN/FLB	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0215175	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition cosmétique comprenant des particules minérales et une polyéthylèneimine.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : L'ORÉAL 14, rue Royale 75008 PARIS France			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inv nteurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		PERRON	
Prénoms		Béatrice	
Adresse	Rue	15 Parc de Diane	
	Code postal et ville	78350	JOUY EN JOSAS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		PAUL	
Prénoms		Laurence	
Adresse	Rue	48 rue de la Marée	
	Code postal et ville	95320	SAINT LEU LA FORET
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		RESTLE	
Prénoms		Serge	
Adresse	Rue	38, Rue du Maréchal Joffre	
	Code postal et ville	95390	SAINT-PRIX
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (N m et qualif du signataire) 28 Février 2003 Françoise LE BLAINVAUX			

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Docket No.: 235208US

Filing Date: Herewith



22850